

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 4 - 7 - 69 951248

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ES FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Scurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

CÔTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - JURA - SAÔNE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. BÉDON 3405.12 K.

25 F.

Bulletin n° 106 - JUILLET 1969

3 JUILLET 1969

VIGNE

MILDIU : Les vignes traitées selon les indications du dernier bulletin (exécution du traitement dès réception) ont été protégées des pluies contaminatrices (28 Juin). Les taches apparues dès le 25 Juin et surtout les 27, 28 et 30 sont consécutives aux contaminations des 18, 20 et 23 Juin. Manifestations de rot gris également.

Après rognage, appliquer un traitement soigné à l'aide de produits cupriques ou organo-cupriques. La protection des grappes devra être assurée, particulièrement après la chute du capuchon floral.

OIDIUM : L'oïdium est à redouter, par suite de l'évolution des conditions climatiques. Ajouter un produit anti-oïdium à la bouillie citée précédemment.

VERS DE LA GRAPPE : COCHYLIS - EUDENIS : Il est encore trop tôt pour traiter.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES : Les conditions climatiques sont défavorables au parasite et le vol est pratiquement stoppé mais il convient d'être attentif car le traitement conseillé a été lessivé, aussi faut-il penser à renouveler la protection.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : Il est nécessaire de continuer la protection.

ANTHRACNOSE DU CERISIER : Effectuer une nouvelle pulvérisation avec l'un des fongicides habituellement conseillés pour les vergers récoltés. Dans ceux de Haute-Saône, les produits à base de Doguadine sont conseillés. Respecter les dates limites d'emploi.

POMMES DE TERRE

Le mildiou de la pomme de terre se manifeste avec virulence suivant les secteurs. Renouveler la protection et ajouter, s'il en est besoin, un insecticide contre le doryphore.

CULTURES LÉGUMIÈRES

TEIGNE DU POIREAU : Il est conseillé d'effectuer une pulvérisation à base d'un ester phosphorique de préférence. Il sera utile d'ajouter à la bouillie un fongicide car l'état sanitaire des plants est généralement défectueux.

SEPTORIOSE DU CELERI : Renouveler les traitements. Là où la maladie est présente, l'emploi de la Doguadine pourra, dans une certaine mesure, enrayer son extension.

HOUBLONS

MILDIU : Profiter du retour du beau temps pour effectuer un traitement très soigné, pour protéger la nouvelle végétation.

PUCERONS : En cas d'apparition de nouvelles colonies, ajouter un produit aphicide au traitement dirigé contre le mildiou.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur
de la Protection des Végétaux - Circonscription
phytosanitaire "BOURGOGNE & FRANCHE-COMTÉ" :

H. SOULIE.

Imprimerie de la Station "Bourgogne et
Franche-Comté" - Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.

7272